

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Nerfs	Muscles	Origine	Trajet	Terminaison
Axillaire (circonflexe)	*deltoïde *petit rond	Tronc secondaire postérieur (creux axillaire, juste derrière le petit pectoral)	*traverse l'espace axillaire latéral pour rejoindre la région latérale du bras	Face profonde du deltoïde
	*Supinateurs *Extenseurs	Même origine	*partie inférieure du creux axillaire *espace axillaire inférieur *loge postérieure du bras *contourne l'humérus *la gouttière bicipitale latérale du pli du coude	A hauteur du capitulum
Radial				
Musculo-cutané	*de la loge antérieure du bras	Tronc secondaire antérolatéral	*traverse la partie INF du creux axillaire *perfore le Coraco-brachial *loge ANT du bras (en arrière du biceps) *Dans le sillon bicipital LAT ; il traverse le fascia brachial	En une branche terminale qui se divise en 2 branches sensibles
Médian	*loge ANT de l'avant bras *muscles de l'éminence thénar de la main	A partir de 2 racines : *LAT : issue du tronc secondaire antérolatéral *MED : issue du tronc secondaire antéro-médial	*partie INF du creux axillaire *la loge antérieure du bras *le pli du coude *La loge ANT de l'avant bras *Le canal carpien (poignet)	Au bord INF du rétinaculum des fléchisseurs
Ulnaire	*une partie des muscles de la loge ANT de l'avant – bras *La plupart des muscles de la main	tronc secondaire antéro-médial	*partie INF du creux axillaire *partie MED du bras *passe en arrière de l'épicondyle MED *s'engage dans la partie MED de la loge ANT de l'avant-bras *traverse la loge du GUYON	Au –dessous du pisiforme
Cutané médian de l'avant-bras	/	Tronc secondaire antéro-médial	*partie INF du creux axillaire *descend dans le bras *traverse le fascia brachial pour devenir superficiel	Au-dessus de l'épicondyle médial
Cutané médial du bras	/	Tronc secondaire antéro-médial	*partie INF du creux axillaire *se dirige obliquement en dedans pour se placer en avant de la veine axillaire *descend dans le bras avec les vaisseaux brachiaux *traverse le fascia brachial	Epicondyle médial